

Comité technique
TC/57/22
**Cinquante-septième session
Genève, 25 et 26 octobre 2021**
**Original : anglais
Date : 4 septembre 2021**
RÉVISION PARTIELLE DES PRINCIPES DIRECTEURS D'EXAMEN DU PÊCHER
Document établi par le Bureau de l'Union
Avertissement : le présent document ne représente pas les principes ou les orientations de l'UPOV

1. Le présent document a pour objet de présenter une proposition de révision partielle des principes directeurs d'examen du pêcher (document TG/53/7 Rev.).
2. Les informations générales concernant la proposition de révision partielle des principes directeurs d'examen du pêcher figurent dans le document TC/57/2 "Principes directeurs d'examen".
3. À sa cinquante-deuxième session¹, le Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) a examiné une proposition de révision partielle du questionnaire technique des principes directeurs d'examen du pêcher (*Prunus persica* (L.) Batsch) sur la base du document TWP/5/13 "Revision of Test Guidelines", paragraphe 17 et annexe XIII. Le TWF est convenu de proposer d'inclure les caractères suivants dans le questionnaire technique (les caractères à inclure sont indiqués en surbrillance et soulignés) (voir le paragraphe 88 du document TWF/52/10 "Report") :

Numéro de caractère	(*)	Nom du caractère
1	(*)	Arbre : taille
2		<u>Arbre : vigueur</u>
3	(*)	<u>Arbre : port</u>
9	(*)	Fleur : type
12		<u>Seulement pour les variétés à fleurs campanulées : Pétale : largeur</u>
13	(*)	<u>Seulement pour les variétés à fleurs en rosette : Pétale : largeur</u>
17	(*)	<u>Anthères : pollen</u>
20	(*)	<u>Limbe : longueur</u>
28	(*)	Limbe : Nervure principale rouge face inférieure
30	(*)	Pétiole : nectaires
31	(*)	Pétiole : forme des nectaires
32	(*)	<u>Fruit : taille</u>
33	(*)	Fruit : forme (vue ventrale)
40	(*)	<u>Fruit : couleur de fond de l'épiderme</u>
44	(*)	Fruit : pubescence de l'épiderme
49		<u>Fruit : adhérence de l'épiderme à la chair</u>
50	(*)	<u>Fruit : fermeté de la chair</u>
51	(*)	Fruit : couleur des caroténoïdes de la chair
58		<u>Fruit : chair fibreuse</u>
60	(*)	Fruit : acidité
61	(*)	<u>Noyau : taille par rapport à celle du fruit</u>
66	(*)	<u>Noyau : adhérence à la chair</u>
68		<u>Époque de début de débourrement foliaire</u>
69	(*)	Époque de début de floraison
70	(*)	Époque de maturité

¹ Organisée en Chine par voie électronique du 12 au 16 juillet 2021

4. Les ajouts proposés dans la section 5 du questionnaire technique sont indiqués en surbrillance et soulignés.

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE	Page {x} de {y}	Numéro de référence :
-------------------------	-----------------	-----------------------

5. Caractères de la variété à indiquer (le chiffre entre parenthèses renvoie aux caractères correspondants dans les principes directeurs d'examen; prière d'indiquer la note appropriée).

Caractères	Exemples de variétés	Note
5.1 (1) Arbre : taille		
très petit	Bonanza, Bonfire, Pix Zee, Zaino	1[]
<u>très petit à petit</u>		2[]
petit	Richaven	3[]
<u>petit à moyen</u>		4[]
moyen	Robin	5[]
<u>moyen à grand</u>		6[]
grand	Redhaven	7[]
<u>grand à très grand</u>		8[]
très grand	Champion	9[]
5.2 (2) Arbre : vigueur		
<u>très faible</u>		1[]
<u>très faible à faible</u>		2[]
<u>faible</u>	<u>J. H. Hale</u>	3[]
<u>faible à moyenne</u>		4[]
<u>moyenne</u>	<u>Robin</u>	5[]
<u>moyenne à forte</u>		6[]
<u>forte</u>	<u>Springtime</u>	7[]
<u>forte à très forte</u>		8[]
<u>très forte</u>		9[]
5.3 (3) Arbre : port		
<u>fastigié</u>	<u>Nectarose, Pillar</u>	1[]
<u>dressé</u>	<u>Fairhaven, Redwing</u>	2[]
<u>dressé à étalé</u>	<u>Albertina, Elegant Lady, Mercil</u>	3[]
<u>étalé</u>	<u>Charles Roux</u>	4[]
<u>retombant</u>	<u>Biancospino</u>	5[]

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE		Page {x} de {y}	Numéro de référence :
Caractères	Exemples de variétés	Note	
5.2.4 (9)	Fleur : type		
campanulée	Dida, Springtime	1[]	
rosacée	Robin, Vesuvio	2[]	
5.5 (12)	Seulement pour les variétés à fleurs campanulées : Pétale : largeur		
<u>très étroit</u>		1[]	
<u>très étroit à étroit</u>		2[]	
<u>étroit</u>	<u>Meydicte</u>	3[]	
<u>étroit à moyen</u>		4[]	
<u>moyen</u>	<u>Bradgust</u>	5[]	
<u>moyen à large</u>		6[]	
<u>large</u>	<u>Monnail</u>	7[]	
<u>large à très large</u>		8[]	
<u>très large</u>		9[]	
5.6 (13)	Seulement pour les variétés à fleurs en rosette : Pétale : largeur		
<u>très étroit</u>	<u>Triumph</u>	1[]	
<u>étroit</u>	<u>Shasta</u>	2[]	
<u>moyen</u>	<u>Robin</u>	3[]	
<u>large</u>	<u>Michelini</u>	4[]	
<u>très large</u>	<u>Veteran</u>	5[]	
5.7 (17)	Anthères : pollen		
<u>absent</u>	<u>J. H. Hale</u>	1[]	
<u>présent</u>	<u>Redhaven</u>	9[]	

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE		Page {x} de {y}	Numéro de référence :
Caractères	Exemples de variétés	Note	
5.8 (20) Limbe : longueur			
<u>très court</u>		1[]	
<u>très court à court</u>		2[]	
<u>court</u>	<u>Jerónimo</u>	3[]	
<u>court à moyen</u>		4[]	
<u>moyen</u>	<u>Fairhaven</u>	5[]	
<u>moyen à long</u>		6[]	
<u>long</u>	<u>Southland</u>	7[]	
<u>long à très long</u>		8[]	
<u>très long</u>		9[]	
5.3 9 (28) Limbe : Nervure principale rouge face inférieure			
absente	Redhaven	1[]	
présente	Sanguine Chanas	9[]	
5.4 10 (30) Pétiole : nectaires			
absente	Crimson Glo, Tejon	1[]	
présente	Redhaven	9[]	
5.5 11 (31) Pétiole : forme des nectaires			
circulaires	Springtime	1[]	
réniiformes	Redhaven	2[]	
5.12 (32) Fruit : taille			
<u>très petit</u>	<u>Nectarine-Cerise</u>	1[]	
<u>très petit à petit</u>		2[]	
<u>petit</u>	<u>Minastar, Springtime</u>	3[]	
<u>petit à moyen</u>		4[]	
<u>moyen</u>	<u>Momée, Springlady, Sunhaven</u>	5[]	
<u>moyen à grand</u>		6[]	
<u>grand</u>	<u>Loring, Zaifer, Zaitabo</u>	7[]	
<u>grand à très grand</u>		8[]	
<u>très grand</u>	<u>Comanche, Maillabig</u>	9[]	

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE		Page {x} de {y}	Numéro de référence :
Caractères		Exemples de variétés	Note
5.6 13 Fruit : forme (vue ventrale) (33)			
aplati large		Alex, Bailou, UFO3	1[]
moyennement aplati		Herastrau, Robin	2[]
rond		Redwing	3[]
elliptique large		Cavalier	4[]
moyennement elliptique		Elberta	5[]
5.14 Fruit : couleur de fond de l'épiderme (40)			
<u>non visible</u>		<u>Fiesta Red</u>	1[]
<u>verte</u>		<u>Ruberrina</u>	2[]
<u>vert crème</u>		<u>Carman</u>	3[]
<u>blanc verdâtre</u>		<u>Morton</u>	4[]
<u>blanc crème</u>		<u>Antonia, Michelin</u>	5[]
<u>crème</u>		<u>Amsden</u>	6[]
<u>blanc rosé</u>		<u>Précoce de Hale</u>	7[]
<u>jaune verdâtre</u>		<u>Veteran</u>	8[]
<u>jaune crème</u>		<u>Fuzalode</u>	9[]
<u>jaune</u>		<u>Sudanell</u>	10[]
<u>jaune orange</u>		<u>Redtop, Victoria</u>	11[]
5.7 15 Fruit : pubescence de l'épiderme (44)			
absente		Daisy, Fantasia, Monco, Zaitabo	1[]
présente		Merspri, Moncav, Rich May	9[]

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE		Page {x} de {y}	Numéro de référence :
Caractères	Exemples de variétés	Note	
5.16 (49)	Fruit : adhérence de l'épiderme à la chair		
<u>très faible</u>	<u>Mme Girerd</u>	<u>1[]</u>	
<u>très faible à faible</u>		<u>2[]</u>	
<u>faible</u>	<u>Redhaven</u>	<u>3[]</u>	
<u>faible à moyenne</u>		<u>4[]</u>	
<u>moyenne</u>	<u>Early Sungrand</u>	<u>5[]</u>	
<u>moyenne à forte</u>		<u>6[]</u>	
<u>forte</u>	<u>Babygold 5</u>	<u>7[]</u>	
<u>forte à très forte</u>		<u>8[]</u>	
<u>très forte</u>	<u>Vivian</u>	<u>9[]</u>	
5.17 (50)	Fruit : fermeté de la chair		
<u>très molle</u>	<u>Amsden, Morettini n° 1, Springtime</u>	<u>1[]</u>	
<u>très molle à molle</u>		<u>2[]</u>	
<u>molle</u>	<u>Fairhaven</u>	<u>3[]</u>	
<u>molle à moyenne</u>		<u>4[]</u>	
<u>moyenne</u>	<u>Flavorcrest, Redtop</u>	<u>5[]</u>	
<u>moyenne à ferme</u>		<u>6[]</u>	
<u>ferme</u>	<u>Honey Blaze, Zaitabo</u>	<u>7[]</u>	
<u>ferme à très ferme</u>		<u>8[]</u>	
<u>très ferme</u>	<u>Babygold 6, Ghiaccio 2</u>	<u>9[]</u>	
5.8 18 (51)	Fruit : couleur des caroténoïdes de la chair		
blanc verdâtre	Charles Roux	1[]	
blanche	Caldesi 2000, Springtime	2[]	
blanc crème	Michelini	3[]	
jaune clair	Armking, Spring Gold	4[]	
jaune	Early Sungrand	5[]	
jaune orange	Lovell, Merrill Franciscan	6[]	
orange	Sungold	7[]	

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE	Page {x} de {y}	Numéro de référence :
-------------------------	-----------------	-----------------------

Caractères	Exemples de variétés	Note
5.19 Fruit : chair fibreuse (58)		
<u>absente ou faible</u>	<u>Redhaven</u>	1[]
<u>moyenne</u>		2[]
<u>forte</u>	<u>Sunhigh</u>	3[]
5.20 Fruit : acidité (60)		
très faible	Monam, Moncav, Monna, Redwing, Zaidaso	1[]
faible	Maillarboom, Monnude, Zaifave, Zaifuro, Zairesu, Zaitabo	2[]
moyenne	Mercil, Monprime, Ryans Sun	3[]
forte	Craucail, Kraprim, Nectaross, Orion, Rich May, Zailice, Zainara	4[]
très forte	Armking, Bracid, Maycrest, Red Robin, Savana Red, Star Bright, Zaibri, Zaitop	5[]
5.21 Noyau : taille par rapport à celle du fruit (61)		
<u>très petit</u>		1[]
<u>très petit à petit</u>		2[]
<u>petit</u>	<u>Alex, Robin</u>	3[]
<u>petit à moyen</u>		4[]
<u>moyen</u>	<u>Redhaven</u>	5[]
<u>moyen à gros</u>		6[]
<u>gros</u>	<u>Somervee</u>	7[]
<u>gros à très gros</u>		8[]
<u>très gros</u>		9[]
5.22 Noyau : adhérence à la chair (66)		
<u>absente</u>	<u>Fairhaven, Fuzalode</u>	1[]
<u>présente</u>	<u>Sweet Gold, Vivian</u>	9[]

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE	Page {x} de {y}	Numéro de référence :
-------------------------	-----------------	-----------------------

Caractères	Exemples de variétés	Note
5.23 (68) Époque de début de débourrement foliaire		
<u>très précoce</u>	<u>Sunred</u>	1[]
<u>très précoce à précoce</u>		2[]
<u>précoce</u>	<u>Springtime</u>	3[]
<u>précoce à moyenne</u>		4[]
<u>moyenne</u>	<u>Redhaven</u>	5[]
<u>moyenne à tardive</u>		6[]
<u>tardive</u>	<u>Genadix 7</u>	7[]
<u>tardive à très tardive</u>		8[]
<u>très tardive</u>	<u>Reine des Vergers</u>	9[]
5.10 24 (69) Époque de début de floraison		
<u>très précoce</u>	Zaibop, Zaitolio	1[]
<u>très précoce à précoce</u>		2[]
<u>précoce</u>	Rich Lady, Springtime	3[]
<u>précoce à moyenne</u>		4[]
<u>moyenne</u>	Monnude, Zaitabo	5[]
<u>moyenne à tardive</u>		6[]
<u>tardive</u>	Maillarflat, Maillarlau	7[]
<u>tardive à très tardive</u>		8[]
<u>très tardive</u>	Summerqueen	9[]

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE	Page {x} de {y}	Numéro de référence :
-------------------------	-----------------	-----------------------

Caractères	Exemples de variétés	Note
5.11 25 Époque de maturité (70)		
très précoce	Rich May, Springtime, Zaibaro	1[]
très précoce à précoce	Zainoar, Zaitani	2[]
précoce	Antonia, Redwing, Rich Lady, Robin	3[]
précoce à moyenne	Craucail, Diamond Princess	4[]
moyenne	Fairhaven, Fantasia, Summer Bright, Zee Lady	5[]
moyenne à tardive	Maillarbig, Savana red, Zaimor	6[]
tardive	Fairlane, Flacara, Veteran, Western Red, Zailati, Zairova	7[]
tardive à très tardive	Andgold, Tardibelle	8[]
très tardive	Rubidoux	9[]
extrêmement tardive	Calante, Jesca	10[]

[Fin du document]